

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2010/2011

Il vaccino viene offerto gratuitamente a:

- soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell'anno 1945 e precedenti)
- soggetti, bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti, affetti da patologie croniche quali:
 - malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
 - malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
 - diabete mellito ed altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e gravi patologie concomitanti)
 - malattie renali con insufficienza renale
 - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 - tumori
 - malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da Hiv
 - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
 - patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 - patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
- donne che all'inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza
- persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per anziani o disabili
- medici e personale sanitario di assistenza, personale di assistenza case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza
- persone conviventi con soggetti portatori di patologie croniche sopra elencate
- personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:
 - allevatori
 - addetti alle attività di allevamento
 - addetti al trasporto di animali vivi
 - macellatori e vaccinatori
 - veterinari pubblici e libero professionisti
- forze di polizia, vigili del fuoco

potranno inoltre fare richiesta di vaccinazione con pagamento della prestazione

- i lavoratori non rientranti nelle precedenti categorie professionali (sono compresi in questo gruppo addetti alle poste e telecomunicazioni, dipendenti della pubblica amministrazione e difesa, polizia municipale, ecc.); infatti, come da indicazioni regionali, **la vaccinazione richiesta a tutela del lavoratore, pubblico o privato, da rischi professionali, è interamente** – vaccino e somministrazione – **a carico del datore di lavoro**, in quanto rientrante nella normativa sulla legislazione del lavoro
- tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che non appartengano alle categorie sopra elencate

Pertanto coloro per i quali non è prevista la gratuità della vaccinazione potranno, compatibilmente con la disponibilità del vaccino, usufruire di tale prestazione previo pagamento di tariffa di **€12.63** (costo del vaccino €3.63 e costo della prestazione €9.00) da effettuarsi su c/c postale n. 41078205 intestato ad ASL della Provincia di Milano 1 Via Al Donatore n. 50 - 20013 Magenta o presso l'ufficio cassa del Distretto di appartenenza.

Per i bambini di età compresa fra 6 e 24 mesi, che non appartengono alle categorie a rischio, è prevista l'offerta del vaccino con esenzione alla spesa, quando rientrano nelle fasce deboli (categorie di esenzione per reddito previste dalla DGR VIII/1587 del 22/12/05 e dal Piano attuativo locale per le vaccinazioni).

Si ricorda che per la prevenzione dell'influenza, ed in generale delle infezioni che si trasmettono per via aerea, è molto importante, oltre la vaccinazione, adottare delle misure di protezione individuali utili a ridurre la trasmissione dei virus, quali:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o usare soluzioni detergenti a base di alcool o salviettine disinfettanti
- coprire naso e bocca in caso di starnuti o tosse ed evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi naso e bocca
- rimanere a casa in “isolamento volontario” se si è affetti da malattia respiratoria febbrile, aerando regolarmente i locali di soggiorno
- usare una mascherina se si ha una sintomatologia influenzale quando ci si trova in ambienti sanitari / ospedalieri